


Geometriai optika



A **fénytan** (optika) a fényjelenségekkel és a fény terjedési törvényeivel foglalkozik.

A **geometriai optika** egyszerű modell, amely a fény terjedését a fényforrásból minden irányba kilépő **fénysugarakkal** írja le, és nem foglalkozik a fény természetével (hullám vagy részecske).


A fény terjedése



- A fény a levegőben (és az egyenletes sűrűségű anyagokban) egyenes vonalban terjed.
- A fény elektromágneses hullám.
- Terjedési sebessége vákuumban $c=3 \cdot 10^8$ m/s. *Ez olyan nagy sebesség, hogy a fény egy másodperc alatt hét és félszer kerülné meg a Földet*
- Ha a test nem átlátszó, mögé nem jut fény, így árnyék keletkezik.
- Egy tárgyat akkor látunk, ha az általa kibocsátott vagy a róla visszavert fény a szemünkbe jut.
- A fénysugár útját nyíllal jelöljük.




Fényvisszaverődés törvénye

- A tükörnek azt a pontját, ahol a beeső fénysugár eléri a tükröt, és visszavert fénysugárrá változik, beesési pontnak nevezzük.
- A beesési pontban a tükörre állított merőleges a beesési merőleges.
- A beeső fénysugár és a beesési merőleges által bezárt szög a beesési szög, a visszavert fénysugár és a beesési merőleges által bezárt szög a visszaverődési szög.
- A mérések alapján a két szög egyenlő egymással.
- **Kimondhatjuk a fényvisszaverődés törvényét:**
 - a.) A visszaverődési szög mindig ugyanakkora, mint a beesési szög.*
 - b.) A beeső sugár, a beesési merőleges és a visszavert sugár egy síkban van.*



Síktükör


- A tükröt merőlegesen érő fénysugár önmagában verődik vissza.
- A síktükörre párhuzamosan eső fénysugarak a visszaverődés után is párhuzamosak
- A síktükörre eső széttartó fénysugarak a visszaverődés után is széttartóak maradnak.




Síktükör

A megfigyelések alapján a síktükör által létrehozott kép:


- **Látszólagos** (a tükörképet a tükör mögött látjuk, ahova nem jut fény, mert a tükör visszaveri, így ernyőn nem fogható).
- a tárggyal megegyező állású,
a tárggyal egyenlő nagyságú ($K=T$),
ugyanolyan messze van a tükörtől, mint a tárgy ($k=t$).



Domború tükör



Domború tükör



- Ha a visszavert sugarakat meghosszabbítjuk a tükör mögött, azok egy pontban metszik egymást. A fénytani tengellyel párhuzamosan beeső sugarak a domború tükörről visszaverődve **úgy haladnak, mintha egy tükör mögötti pontból indulnának ki.**
- Domború tükörnél a visszavert sugarak **csak látszólag indulnak ki** a fókuszpontból, ezért ezt látszólagos gyújtópontnak nevezzük.

Domború tükör (alapfogalmak)

$$r=OC$$

$$f=OP= r/2: \text{fókusztávolság}$$


Optikai
középpont

Geometriai
középpont


fókuszpont

optikai
tengely


A párhuzamos fénynyaláb a domború tükrön való visszaverődés után széttartó nyaláb lesz.



Domború tükör (nevezetes sugarak)



Domború tükör képképzése





**A keletkezett kép
minden esetben:**

- egyenes állású
- kicsinyített
- látszólagos
- kép a tükör mögött

Homorú tükör


- A gömbtükör olyan, mintha egy nagy üveglabdából szeltük volna le. Ha belülről nézve tükör, akkor homorú tükörről beszélünk.
- A tükör pereme kör alakú, és gyakran beszélünk a tükör középpontjáról. A domború tükörhöz hasonlóan meg kell különböztetni a **geometriai középpontot** (G) és a **fénytani középpontot** (O). A kettőt összekötő egyenes a tükör *optikai tengelye*. O és G távolsága a *gömb sugara* (r).
- A homorú tükörre párhuzamosan eső sugarak a visszaverődés után összetartóvá válnak.



Homorú tükör (nevezetes sugarak)



- A homorú tükörre az optikai tengellyel párhuzamosan eső sugarak visszaverődés után a fókuszponton haladnak keresztül.
- A fókusztávolság a gömbi sugár fele (mint a domború tükörnél). A homorú tükör esetében a visszavert sugarak valóban átmennek a fókuszponton, ezért ezt valóságos gyújtópontnak nevezzük.
- A homorú tükör a fókuszpontjából (gyújtópont) érkező fénysugarakat párhuzamosan veri vissza.
- *Látható, hogy a két sugármenet éppen egymás megfordítottja. Tükrök esetében ez mindig így van.*





Homorú tükör ($t < f$)

Ha a tárgy a fókuszponton belül van akkor a

kép:

- a) látszólagos (tükör mögött keletkezik)
- b) tárggyal megegyező állású
- c) nagyított







Homorú tükör ($t > f$)

Ha a tárgy a fókuszponton kívül van akkor a kép:

- a) **valódi** (ernyőn felfogható)
- b) **fordított állású**
- c) **nagyított** (ha $f < t < 2f$)
- d) **kicsinyített** (ha $2f < t$)

A homorú tükör néhány alkalmazása:

- a) autó fényszórója
- b) orvosi tükör
- c) olimpiai láng meggyújtása





Homorú tükör képalkotása (speciális esetek)

Ha a **tárgy a geometriai középpontban** van, akkor a kép is a geometriai középpontban keletkezik. A **kép:**

- a) **valódi**
- b) **fordított állású**
- c) **nagyítása $N = 1$**

A **fókuszpontban lévő tárgyról** a homorú gömbtükör **nem alkot képet**.



Gömbtükrök leképezési törvénye

f: fókusztávolság

k: képtávolság

t: tárgytávolság

N: nagyítás

K: képnagyság

T: tárgynagyság

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{k} + \frac{1}{t}$$

$$N = \frac{k}{t} = \frac{K}{T}$$

Előjelek a számításoknál



- t és T minden esetben pozitív
- r és f homorú tükör esetén **pozitív**, domború tükörnél **negatív**
- k és K valamint N valódi kép esetén **pozitív**, látszólagos kép esetén **negatív**

Feladat

Feladat: Egy homorú tükör görbületi sugara 80 cm. Mekkora és milyen nagyítású képet alkot a tükör előtt 60 cm-re lévő 5 cm magas tárgyról.

Adatok:

$$t = 60 \text{ cm}$$

$$T = 5 \text{ cm}$$

$$r = 80 \text{ cm}$$


$$K = ?$$

$$N = ?$$

Képletek:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{t} + \frac{1}{k}$$

$$N = \frac{k}{t} = \frac{K}{T}$$



Feladat



Feladat: Mekkora a nagyítása annak a domború tükörnek, melytől a tárgyat 40 cm távolságban helyeztük el? A fókusz távolság 20 cm.

Adatok:

$$t = 40 \text{ cm}$$

$$f = -20 \text{ cm}$$

$$k = ?$$

Képletek:

$$\frac{1}{t} + \frac{1}{k} = \frac{1}{f} \quad N = \frac{K}{T} = \frac{k}{t}$$

Számítás:

$$\frac{1}{40} + \frac{1}{k} = -\frac{1}{20}$$

$$\frac{1}{k} = -\frac{1}{20} - \frac{1}{40}$$

$$\frac{1}{k} = -\frac{3}{40}$$

$$k = -\frac{40}{3} \text{ cm}$$


$$N = -\frac{40}{3} : 40 = -\frac{1}{3}$$

A kép harmad akkora lesz, mint a tárgy.


Fénytörés



- Amikor a fény a levegőből a vízbe jut, a fénysugár a merőlegeshez törik (a törési szög kisebb, mint a beesési szög)



A fénytörés törvényei



A terjedési sebességek (c) aránya adja a közegek törésmutatóját (n).


$$n_{2,1} = \frac{c_2}{c_1} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

Közeghatárra érkezve a fény terjedési sebessége megváltozik, ezért a fény útja megtörik.

Optikailag ritkább közegből optikailag sűrűbb közegbe érve a fény a beesési merőlegeshez törik. A beesési szög (α) nagyobb, mint a törési szög (β).

Optikailag sűrűbb az olyan közeg, amelyben a fény terjedési sebessége kisebb.

Teljes visszaverődés, határszög




Optikailag sűrűbb közegből ritkább felé haladva van olyan beesési szög, melynél a törési szög 90° . Ez a beesési szög a **határszög**.

Határszögnél nagyobb beesési szög esetén **teljes visszaverődés** történik.

Domború lencse, alapfogalmak




A domború lencse fénytörése

- A domború lencse a tengelyével párhuzamosan ráeső sugarakat úgy törí meg, hogy azok a lencse másik oldalán egy ponton, a **gyújtóponton (fókus)** haladnak át. A fókuszpont jele: F . Ezért a domború lencsét **gyűjtőlencsének** is nevezik. A fókuszpont távolsága a lencsétől a **fókusztávolság. Jele: f** .
- A lencséknek - nem úgy mint a tükröknek - **mindkét oldalukon van gyújtópontjuk** (fókus), éspedig mindkét oldalon ugyanakkora távolságban.



Domború lencse (gyűjtő lencse)

- A lencsére most a fókuszból érkeznek széttartó sugarak.
- A gyűjtőlencse úgy töri meg a **fókuszából érkező széttartó sugarakat**, hogy azok a lencsén áthaladva párhuzamossá válnak.
- Ha még közelebb visszük a lencséhez a fényforrást (fókuszon belülre), a sugarak széttartóak maradnak, de kisebb mértékben, mint a lencse előtt.
- Ha a fénysugár, most a lencse optikai középpontjába érkezik.
A fénysugár irányváltozás nélkül halad tovább.



Domború lencse képalkotása



A domború lencse képalkotása

Ha a tárgy távolsága nagyobb a fókusz távolság kétszeresénél ($t > 2f$), akkor a kép

- valódi,
- kicsinyített és
- fordított állású. A kép távolsága az optikai középponttól nagyobb, mint a fókusz távolság, de kisebb, mint a fókusz távolság kétszerese.

Ha a tárgy távolsága a fókuszról a fókusz távolság kétszerese ($t = 2f$), akkor a kép


- valódi,
- fordított állású, és
- ugyanakkora mint a tárgy.
- A képtávolság ugyanakkora, mint a tárgytávolság.



Domború lencse képképzése


Ha a tárgy távolsága az egyszeres és a kétszeres fókusz távolság között van ($f < t < 2f$), akkor a kép

- valódi,
- fordított állású
- nagyított.
- A kép távolsága nagyobb, mint a kétszeres fókusz távolság.
- Ha a tárgy a lencse fókuszában van, nem keletkezik kép!




Ha a tárgy közelebb van a lencséhez, mint a fókusz ($t < f$), akkor a kép

- látszólagos, és ugyanazon az oldalon keletkezik, ahol a tárgy van.
- nagyított és egyenes állású.
- A lencse ebben az esetben nagyítóként működik.



Képszerkesztések






Homorú lencse (szórólencse)

Nevezetes sugarak

- A homorú lencse szétszórja a fénysugarakat, ezért szórólencsének is nevezik.
- Az optikai tengellyel párhuzamosan beeső fénysugarak szétszórtnak haladnak tovább úgy, mintha a fókuszról indultak volna ki.
- A fényforrással ellenkező oldali fókusz felé beeső fénysugár az optikai tengellyel párhuzamosan halad tovább.
- Az optikai középpontba beeső fénysugár irányváltozás nélkül halad tovább.

A homorú lencse képalkotása

- A szórólencse a tárgyról mindig virtuális, egyenes állású, kicsinyített képet alkot.



Lencsék leképezési törvénye, nagyítás



$$\frac{1}{f} = \frac{1}{k} + \frac{1}{t}$$

$$N = \frac{k}{t} = \frac{K}{T}$$

f: fókusztávolság

k: képtávolság

t: tárgytávolság

N: nagyítás

K: képnagyság

T: tárgynagyság

Előjelek a számításoknál



- t és T minden esetben pozitív
- D és f gyűjtőlencse esetén pozitív, szórólencse esetén negatív
- k és K valamint N valódi kép esetén pozitív, látszólagos kép esetén negatív

Feladatok

1.feladat

Homorú **gömbtükrrel** a gyertya lángját kétszeres nagyításúvá vetítjük ki. Mekkora a tükör fókusztávolsága, ha a láng és az ernyő között 20 cm a távolság?

Megoldás:

$$N = 2 = k/t \quad 1/t + 1/k = 1/f$$

$$k = 2t \quad 2t - t = 20$$

$$k - t = 20 \text{ cm} \quad t = 20 \text{ cm}$$

$$k = 2t = 40 \text{ cm}$$

$$1/20 + 1/40 = 1/f$$

$$2/40 + 1/40 = 1/f$$

$$3/40 = 1/f$$

$$f = 40/3 \text{ cm}$$

A tükör fókusztávolsága $40/3$ cm.



2. feladat

Mekkora és milyen képet alkot a 20 cm fókusztávolságú **gyűjtőlencse** a tőle 25 cm-re elhelyezett tárgyról?

Megoldás:

$$f = 20 \text{ cm} \quad 1/t + 1/k = 1/f$$

$$t = 25 \text{ cm} \quad 1/25 + 1/x = 1/20$$

$$k = x \quad 1/x = 1/20 - 1/25$$

$$1/x = 5/100 - 4/100$$

$$1/x = 1/100$$

$$x = 100$$

A kép a lencsétől 100 cm-re keletkezik. Fordított állású, valódi kép négyszeres nagyításban.

Feladatok



FGy(12-16)783

Gyűjtőlencse előtt 45 cm-re 4 cm magas tárgy áll. A lencse fókusz távolsága 25 cm.

- a) Hol van és mekkora a tárgy képe?
- b) Hová kell elhelyezni az előbbi tárgyat, hogy a lencse ugyanolyan nagyítású, de látszólagos képet alkosson a tárgyról?
- c) Hol lesz ekkor a kép?

A feladathoz készíts rajzot!

$$k_1 = 56,25 \text{ cm}; N_1 = 1,25; K = 5 \text{ cm}$$

$$t_2 = 5 \text{ cm}; k_2 = -6,25 \text{ cm}$$